

ERRATA DO ARTIGO

“Biometria de frutos e sementes da castanheira-do-Brasil da região Médio-Norte do Mato Grosso”
Nativa, Sinop, v.5, esp., p. 628-633, dez. 2017

Onde lê-se:

Tabela 3. Valores médios da morfometria dos frutos e sementes de *B. excelsa* nos municípios de Itaúba e Cláudia, MT, em três épocas de coleta na safra 14/15.

Table 2. Statistical variables of the fruit and seed morphometry of *B. excelsa* in the municipalities of Itaúba and Cláudia, MT, in three seasons of collection in the harvest 14/15.

Parâmetros morfométricos	Coletas	
	26/11/14	26/11/14
Número de frutos	187,0 b	Número 187,0 b
MF (g)	154,2 a	MF (g) 154,2 a
DEqF (cm)	11,1 a	DEqF 11,1 a
DlongF (cm)	10,9 a	DlongF 10,9 a
Es. Exocarpo (mm)	4,4 a	Es. 4,4 a
Es. Mesocarpo (mm)	9,3 a	Es. 9,3 a
NS/fruto	17,3 a	NS/fruto 17,3 a
MS/fruto (g)	123,6 a	MS/fruto 123,6 a
M1S (g)	5,9 a	M1S (g) 5,9 a
DEqS1 (mm)	17,6 a	DEqS1 17,6 a
DEqS2 2 (mm)	23,6 ab	DEqS2 2 23,6 ab
DlongS (mm)	36,1 a	DlongS 36,1 a

MF: massa do fruto (ouriço); DEqF e DlongF: diâmetros equatorial e longitudinal do fruto (ouriço); NS e MS: número de sementes e massa fresca de sementes; M1S: massa fresca de uma semente com tegumento; DEqS1 e DEqS2: diâmetros equatoriais 1 e 2 da semente (Figura 3); DlongS: diâmetro longitudinal da semente (Figura 3).

Lê-se:

Tabela 3. Valores médios da morfometria dos frutos e sementes de *B. excelsa* nos municípios de Itaúba e Cláudia, MT, em três épocas de coleta na safra 14/15.

Table 3. Statistical variables of the fruit and seed morphometry of *B. excelsa* in the municipalities of Itaúba and Cláudia, MT, in three seasons of collection in the harvest 14/15.

Parâmetros morfométricos	Coletas		
	26/11/14	22/12/14	10/03/15
Número de frutos	187,0 b	431,0 a	27,0 c
MF (g)	154,2 a	163,6 a	136,2 b
DEqF (cm)	11,1 a	11,1 a	10,4 b
DlongF (cm)	10,9 a	10,9 a	10,3 b
Es. Exocarpo (mm)	4,4 a	4,3 a	3,7 b
Es. Mesocarpo (mm)	9,3 a	8,8 a	7,8 b
NS/fruto	17,3 a	17,6 a	17,2 a
MS/fruto (g)	123,6 a	114,9 a	81,6 b
M1S (g)	5,9 a	5,3 b	4,1 c
DEqS1 (mm)	17,6 a	17,3 a	16,6 b
DEqS2 2 (mm)	23,6 ab	23,9 a	23,1 b
DlongS (mm)	36,1 a	36,5 a	35,8 a

MF: massa do fruto (ouriço); DEqF e DlongF: diâmetros equatorial e longitudinal do fruto (ouriço); NS e MS: número de sementes e massa fresca de sementes; M1S: massa fresca de uma semente com tegumento; DEqS1 e DEqS2: diâmetros equatoriais 1 e 2 da semente (Figura 3); DlongS: diâmetro longitudinal da semente (Figura 3).

Onde lê-se:

Tabela 3. Descrição qualitativa (em percentual de ocorrência) da integridade dos frutos de castanheira-do-Brasil, nos municípios de Itaúba e Cláudia, MT, em três épocas de coleta na safra 14/15.

Table 3. Qualitative description (in percentage of occurrence) of the integrity of Brazilian chestnut fruits, in the municipalities of Itaúba and Cláudia, MT, in three seasons of collection in the harvest 14/15.

Variáveis qualitativas	Época de coleta		
	26/11/14	26/11/14	26/11/14
Frutos com fungos	39,19	39,19	39,19
Frutos com cupins	0,90	0,90	0,90
Frutos Intactos	54,50	54,50	54,50
Frutos Deteriorado	29,73	29,73	29,73
Frutos sem exocarpo	15,77	15,77	15,77
Frutos com opérculo	86,49	86,49	86,49
Frutos com sementes fungadas	9,01	9,01	9,01
Total de frutos por coleta	222	222	222

Lê-se:

Tabela 3. Descrição qualitativa (em percentual de ocorrência) da integridade dos frutos de castanheira-do-Brasil, nos municípios de Itaúba e Cláudia, MT, em três épocas de coleta na safra 14/15.

Table 3. Qualitative description (in percentage of occurrence) of the integrity of Brazilian chestnut fruits, in the municipalities of Itaúba and Cláudia, MT, in three seasons of collection in the harvest 14/15.

Variáveis qualitativas	Época de coleta		
	26/11/14	22/12/14	10/03/15
Frutos com fungos	39,19	98,68	100,00
Frutos com cupins	0,90	0,95	0,75
Frutos Intactos	54,50	33,65	0,00
Frutos Deteriorado	29,73	48,20	35,07
Frutos sem exocarpo	15,77	18,15	64,93
Frutos com opérculo	86,49	91,30	37,31
Frutos com sementes fungadas	9,01	2,84	48,51
Total de frutos por coleta	222	529	134